

“ Papy, si ton cœur bat pour moi,
va le faire contrôler ”

SEMAINE DU RYTHME CARDIAQUE
DU 17 AU 21 JUIN 2019
Contrôlez gratuitement votre rythme cardiaque.
Prenez rendez-vous sur www.lebonrythme.be



1 AVC sur 5 est causé par une fibrillation auriculaire.



Pour diminuer le risque d'AVC, prenez le bon rythme :
Parlez-en à votre médecin et faites tester votre cœur
régulièrement.

Plus d'infos sur www.lebonrythme.be

**Grâce à vous, jusqu'à 80 % des AVC
ischémiques peuvent être évités !¹**

Cher Docteur,

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent.²

Au-delà de 40 ans, 1 personne sur 4 présentera un jour une fibrillation auriculaire (FA).²

La fibrillation auriculaire peut durer quelques minutes, quelques heures voire quelques jours. Si la fibrillation auriculaire est persistante, on risque de s'habituer aux symptômes et de les considérer comme normaux.

Toutefois, la fibrillation auriculaire peut également passer complètement inaperçue, et ne présenter aucun symptôme. Elle peut être découverte par hasard au cours d'un contrôle de routine. Jusqu'à 45 % des personnes atteintes de FA ne le savent pas.³

1 AVC sur 5 est causé par une fibrillation auriculaire.⁴

Selon le National Stroke Association (USA), environ 15 % des patients décèdent rapidement après l'AVC. Seuls 10 % des victimes d'un AVC récupèrent complètement, 25 % ont des séquelles mineures, 40 % ont des séquelles modérées à sévères, nécessitant des soins spécifiques et 10 % ont besoin de soins dans un établissement de soins infirmiers ou de soins de longue durée.⁵

Un AVC chez un patient atteint de FA est associé à un pronostic plus défavorable, une augmentation des complications médicales et neurologiques, ainsi qu'un taux de mortalité à l'hôpital plus élevé par rapport à un AVC chez un patient non atteint de FA.⁶

Heureusement, la fibrillation auriculaire se détecte facilement !


L'Alliance Bristol-Myers Squibb/Pfizer, en partenariat avec le BehRA (Belgian Heart and Rhythm Association), le Belgian Stroke Council, la Ligue Cardiologique Belge et OverRslag/Coup de Cœur, vous propose de participer à la campagne de sensibilisation à la Fibrillation Auriculaire "Le Bon Rythme" afin de sensibiliser le grand public à cette problématique.

Cette campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Youtube) via un film. Vous pouvez marquer votre participation grâce à l'affiche et les brochures ci-jointes. Vous pouvez également commander le matériel de la campagne sur www.pfizerpro.be/le-bon-rythme

Un AVC ne peut plus être l'évènement qui met à jour une fibrillation auriculaire !

**Votre rôle est essentiel, agissons ensemble
pour une meilleure prévention !**

www.lebonrythme.be



BELGIAN
STROKE
COUNCIL

BehRA
BELGIAN HEART AND RHYTHM ASSOCIATION

Coup de Cœur

LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE ASBL

OverRslag

Bristol-Myers Squibb

Pfizer

1. Friedman B. European Heart Journal (2018) 39, 2984-2986 & supplementary appendix. 2. <http://www.behrareu.space-public/fibrillation-auriculaire> (consulté le 15 avril 2019). 3. Camm J et al. 2014 The root map for change and the european atlas on the prevention of AF related stroke. 4. Marini C et al. Stroke. 2005;36:1115-1119. 5. <http://www.stroke.org/we-can-help/survivors/stroke-recovery/first-steps-to-recovery/rehabilitation-therapy-after-a-stroke/> (consulté le 15 avril 2019). 6. Stegler C et al. European Heart Journal, Volume 25, Issue 19, 1 October 2004, Pages 1734-1740.