



IMPACT IMPORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE ^{6,7}



Expériences possibles:



DOULEUR



Changements de pansements plusieurs fois par jour



Stigmatisation sociale



Sécrétions malodorantes des abcès



Isolement social



Aucun contrôle



Faible estime de soi



Dépression



Mobilité réduite

Ces dernières années, la **connaissance de la maladie et son traitement se sont considérablement améliorés**. Avec un traitement approprié et quelques conseils simples, les symptômes peuvent être considérablement atténués. ¹

Ne restez pas seul!

Si vous supposez que vous êtes atteint par cette maladie, il est important de consulter un dermatologue qui peut vous aider à contrôler cette maladie.



Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez consulter:



HS-online.be

Un site web pour les patients avec plus d'information sur la maladie de Verneuil



065 22 84 08
info@verneuil.be

www.lamvb.be

Le site web de l'association de patients francophone. L'association est à votre service pour:

- L'écoute téléphonique
- L'information
- La formation
- Des rencontres entre malades et proches
- Un accompagnement administratif
- Un soutien moral

Vous pouvez les contacter en toute discrétion

1. Jemec G. N Engl J Med. 2012; 366:158-64.
2. Collier F, Smith RC, Morton CA. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013;346.
3. Pink AE et al. J Invest Dermatol 2012;132:2459-61.
4. Nazary M et al. Eur J Pharmacol 2011;672:1-8.
5. American Academy of Dermatology. Hidradenitis suppurativa. Available at: <https://www.aad.org/public/diseases/painful-skin-joints/hidradenitis-suppurativa>- Accessed 6 Apr 2017.
6. Smith HS, Chao JD, Teitelbaum J. Clin J Pain 2010;26:435-44.
7. Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB. Postgrad Med J. 2014; 90 (1062):216-21.
8. Zouboulis CC et al. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2015;29(4):619-644.
9. Poli F, Jemec GB, Revuz J. Clinical presentation (Chapter 3) in: Jemec GB, Revuz JE, Leyden JJ (Eds.) Hidradenitis suppurativa. Springer, Heidelberg, Germany; 2006:11-24.
10. Market research, Living with Hidradenitis Suppurativa, performed by Research Partnership (n=315 patients); AbbVie report 2014.

AbbVie sa/nv - BEGEN170142 - May 2017

LA MALADIE DE VERNEUIL



La maladie de Verneuil est une maladie **chronique de la peau** avec des inflammations douloureuses et un impact important sur la qualité de vie¹

Machine Virulente
Mon Moi qui s'en Va
Ma Vie...
M'aider? Vite!
Maudire Véritablement
Ma Volonté
Mal Violent

Mal Vivant
Mon corps Vampirisé
Mille espoirs Vaincus
Ma façon de Vivre
Marcher seul dans la Vie
Mettre ma Vie entre parenthèses

Environ 1 personne sur 100 est concernée par cette maladie¹

BRISONS ENSEMBLE LE SILENCE ET LES TABOUS

abbvie



QUI EST TOUCHÉ PAR LA MALADIE DE VERNEUIL?

TOUT ÂGE



Mais se développe en général vers l'âge de 21ans et le taux diminue après 50 ans ¹

SURTOUT DES FEMMES



Il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes touchés ¹

ATTEINTE FAMILIALE



Environ 1 patient sur 3 possède des antécédents familiaux

PLUSIEURS FACTEURS CONTRIBUTIFS POSSIBLES



Facteurs génétiques ³



Sexe et facteurs hormonaux ⁴



Surpoids ⁴



Tabagisme ⁴

LA MALADIE DE VERNEUIL N'EST PAS CONTAGIEUSE



La maladie de Verneuil n'est pas due à un manque d'hygiène ⁵




COMMENT POSER LE DIAGNOSTIC?

Sur base de 3 critères simples ²:

- Lésions typiques:** des nodules, abcès et furoncles rouges et douloureux et des fistules et cicatrices sur la peau
- Régions typiques:** des lésions au niveau de l'aîne, des aisselles, entre les fesses, sur ou sous les seins, sur le pubis ou bien dans la zone génitale ou anale

Zones cutanées portant de nombreuses racines capillaires ou de nombreuses glandes sudoripares (par exemple aisselles et plis de l'aîne).

Zones du corps où la peau se frotte à la peau, par exemple sous les seins, en zone fessière et sur la face interne des cuisses.



- Lésions récurrentes:** au moins 2 fois au cours des 6 derniers mois

Malgré ces critères simples, trop de temps peut s'écouler avant que le patient reçoive le bon diagnostic. La méconnaissance de la maladie par le corps médical y contribue.

Ça prend environ:



EVOLUTION DE LA MALADIE DE VERNEUIL

HURLEY GRADE 1




Une forme légère affecte des zones cutanées isolées. Il s'agit généralement de boutons douloureux, de nodules ou d'abcès qui sont souvent pris pour une manifestation d'acné vulgaire ou pour un poil incarné.

HURLEY GRADE 2



Au stade modéré, les lésions cutanées, comme les abcès ou furoncles, reviennent régulièrement et affectent plusieurs zones du corps. Les inflammations récurrentes conduisent souvent à la formation de tissu cicatriciel et de fistules (canaux, drainant les exsudats de lésions profondes).

HURLEY GRADE 3



Les formes sévères sont caractérisées par des ulcères de grande taille, reliés entre eux par des fistules et de grandes cicatrices.

Dans certains cas, la maladie de Verneuil peut évoluer vite. Un diagnostic et prise en charge précoces sont donc indispensables. ⁹