

TE WEINIG PREVENTIE VOOR LONGONTSTEKING BIJ VOLWASSENEN*

OORZAKEN



VIRUS



BACTERIE
(1/3)



SCHIMMEL

SYMPTOMEN



HOGЕ
KOORTS



ZWARE
EN DROGE
HOEST



KORTADEMIGHEID
BIJ DAGELIJKSE
ACTIVITEITEN

GEVOLGEN



HET DUURT GEMIDDELD TWEE WEKEN
OM TE HERSTELLEN, MAAR DAT WORDT
VAAK GEVOLGD DOOR EEN LANGERE
RUSTPERIODE

ERNSTIGE GEVOLGEN



430
OVERLIJDENS

IN BELGIË,
ONGEVEER 430
OVERLIJDENS



ONGEVEER 5800
ZIEKENHUISOPNAMES



STERFTECIJFER
TOT 40% BIJ 85+

PNEUMONIA :
LUCHTWEGINFECTIE



PREVENTIE IS MOGELIJK

EN WORDT AANBEVOLEN VANAF 50 JAAR



LAGE VACCINATIEGRAAD

65+



SLECHTS 12% VAN DE 65+ LAAT ZICH
VACCINEREN TEGEN LONGONTSTEKING
TERWIJL BIJNA 40% KIEST VOOR HET
GRIEPPVACCIN

12%

PNEUMOKOKKENVACCIN

40%

GRIEPPVACCIN

65+



BIJ DE 65+ MET EEN ZWAKE GEZONDHEID
(HARTLIJDEN, LONGLIJDEN, DIABETES, ETC.)
IS HET VERSCHIL NOG STERKER:

27%

PNEUMOKOKKENVACCIN

60%

GRIEPPVACCIN